

**Резюме по клиническим исследованиям
препарата Гамамелис ДН,
суппозитории ректальные гомеопатические**

Препарат Гамамелис ДН, суппозитории ректальные гомеопатические, производство ООО «Доктор Н», содержит настойку матричную гомеопатическую *Namamelis virginiana* D2.

В препарате используется разведение D2, которое не обладает токсичным действием.

***Namamelis virginica* L.** – Гамамелис виргинский.

Листопадный сильно ветвистый кустарник или дерево до 6 м высоты. Кора ствола и ветвей светло-серая. Листья обратно-яйцевидные, асимметричные, сверху голые. Цветки мелкие, ароматные, в пучках по 2-5, с четырьмя лентовидными ярко-желтыми лепестками появляются поздней осенью. Плод – коробочка с двумя черными блестящими семенами, созревающими следующей за цветением весной. Произрастает в лесной зоне США.

Культивируется в садах в средней и южной полосе Европейской части РФ, на Черноморском побережье Кавказа.

Применяемая часть: свежая кора с ветвей и корня.

Химический состав: гликозид гамамелитанин (в коре – 6%, в листьях – 7-11%), расщепляющийся на галловую кислоту и гамамелозу; кверцитин, флавофены, эфирное масло, в состав которого входят глицериды пальмитиновой и олеиновой кислот, фитостерин.

Применение в гомеопатии.

Namamelis ввел в гомеопатию в 1851 г. д-р Престон (Preston), после проведенных испытаний на себе и на других лицах. Престон установил, что

средство вызывает прилив крови к голове и носовое кровотечение. Он хорошо изучил действие Hamamelis и нашел, что оно является одним из лучших средств при варикозном расширении вен, при тромбозах и кровоточащем геморрое. Ценность лечебного действия этого средства на венозную систему было подтверждено также Герингом и Гейлем. Подобно Arnica это средство широко применяется при различных травмах с разможением тканей, с резкой болезненностью; последняя является показанием для назначения Hamamelis при травме. Hamamelis является хорошим гемостатиком при кровотечениях из самых различных органов, особенно когда больной жалуется на боль и слабость, часто не соответствующие кровотечению. Hamamelis применяется успешно в акушерской, гинекологической и хирургической практике.

Клиника.

Головные боли. Кровоизлияния. Ангиомы. Травмы. Гематурия. Гемофилия. Геморрой. Геморрагии. Пурпура. Флебит. Варикозные язвы. Орхит. Дисменорея. Аменорея. Отморожения. Ожоги. Оофорит.

Главные показания.

Нервная система. Сильные головные боли с пульсацией в висках.

Ощущение, что голова разорвется. Головные боли с носовыми кровотечениями. Головокружение при ходьбе.

Глаза. Послеоперационная травма глаза. Боли в глазах. Кровоизлияние внутрь глаза.

Дыхательные органы. Пассивные кровотечения из носа. Варикозное расширение вен горла. Сухой, щекочущий кашель от застоя крови в горле и зеве. Кровохаркание.

Пищеварительные органы. Тошнота, отрыжка, икота, хуже от свинины. Судорожные боли в подложечной области. Желудочные кровотечения. Кишечные кровотечения. Геморрой с кровоточащими болезненными узлами.

Мочеполовые органы. Гематурия на почве застойных явлений в брюшной полости и малом тазу. Орхит с сильной болезненностью и опуханием яичек.

Женские органы. Боли в пояснице. Боли внизу живота и бедрах. Аменорея с варикозным кровотечением из носа. Пассивная метроррагия. Маточное кровотечение темной и яркой кровью. Резкие боли в яичниках.

Нижние конечности. Варикозное расширение вен с сильными болями. Флебиты и тромбофлебиты. Язвы голени. Сильная слабость в конечностях.

Суставы. Боль в шейных позвонках. Боли в крестце. Ригидность локтевых и лучезапястных суставов, суставов кисти.

Кожа. Отморожения. Ожоги. Пурпура. Экхимозы.

Модальности. Ухудшение от тепла, сырости, прикосновения. Улучшение от покоя.

Дозы. Дается в 1х, 2х, 3х и 6 делениях. Наружно при тромбофлебите – примочка из тинктуры пополам с водой. При геморрое – 10% мазь и свечи.

За время выпуска препарата накоплен большой положительный опыт клинического исследования, показывающий его высокую эффективность, хорошую переносимость и безопасность.

Рекламаций по данному препарату за время выпуска не было. Все пациенты отмечали хорошую переносимость препарата. Побочных явлений не наблюдалось.

Литературные источники.

1. Ж.Шаретт «Практическое гомеопатическое лекарствоведение», - М:Гомеопатическая медицина, 2000.
2. Агеева Т.К. Реперториум: «Практическое пособие для врачей-гомеопатов».-М: Московская Правда, 1993.
3. Агеева Т.К. «Гомеопатические препараты в арсенале лечебных средств// Новая аптека.-2001.- № 9.
4. Геринг К. «Ведущие симптомы нашей Materia Medica: в 10 тт., перевод с английского, под редакцией С-П Песониной, Ю.В.Васильева- С-П: Гомеопатия и фитотерапия.- 1998.
5. Киселева Т.Л., Агеева Т.К., Цветаева Е.В. «Гомеопатические лекарственные средства, разрешенные к медицинскому применению на территории Российской Федерации// Учебно-справочное пособие/ под редакцией Т.Л.Киселевой.- М.: АОЗТ «Велес»,- 2000.
6. Вавилова Н.М. «Гомеопатическая фармакодинамика», - М: Гом.центр «Эверест», - 1994